診療科	外科
レジメン名称	TS-1+ＰＴＸ療法
パスID	00000322
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ジフェンヒドラミン50ｍｇをＰＴＸ投与30分前に内服。
デキサメタゾン、H2 blockerの投与は必須。
TS-1　80ｍｇ/㎡　2×　ｄａｙ1～14（2投1休）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8
1	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ))	1 本		点滴静注	30分で	1回							1回
2	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2ml/瓶) 大塚生食注TN/50mL1ｷｯﾄ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用20mg「ｻﾜｲ」	1 vial 1 本 1 A		点滴静注	30分で	1回							1回
3	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 生理食塩液PL「ﾌｿｰ」/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ))	1 vial 1 本		点滴静注	30分で	1回							1回
4	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注30mg/5mL「NK」 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」/250mL1袋(250ml/袋)	50 mg/m2 1 袋	55 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回							1回
5	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ))	1 本		点滴静注	30分で	1回							1回