

診療科	外科
レジメン名称	CDDP+TS-1療法（外来）
パスID	00000070
1クール	35日間
最大クール数	3回まで

備考

\*TS-1は 投与量：80mg/m<sup>2</sup>（分2）、投与日：day1~21（2週休薬） で内服。  
※ 血液学的毒性や全身状態を考慮して、投与量を変更する場合あり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						8
1	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A		点滴静注	30分で	1回
	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1 本				
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 本				
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1時間で	1回
	アスハラカリウム注10mEq	1 A				
3	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1時間で	1回
4	20%マンニトール注射液「YD」300mL	200 mL		点滴静注	3時間で	1回
5	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1時間で	1回
	アスハラカリウム注10mEq	1 A				
6	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1時間で	1回
7	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	30分で	1回
8	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	60 mg/m <sup>2</sup>	66 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	1回
	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/	1 本				