

診療科	外科
レジメン名称	IP療法
パスID	00000095
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考  
病名：低分化型神経内分泌腫瘍（PDNEC）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	フルリック2号輸液/1003mL1キット アミバルン輸液/200mL1袋	1 袋 1 袋		中心静脈注射	1日で	1回													
2	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋) プロセト注20mg「トワ」	1 袋 0.5 A		点滴静注	3時間で	1回													
3	光糖液5%/5%500mL1瓶 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	1 本 1 本		点滴静注	3時間で	1回													
4	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋) プロセト注20mg「トワ」	1 袋 0.5 A		点滴静注	3時間で	1回													
5	20%マンニトール注射液「YD」300mL	1 袋		点滴静注	12時間で	1回													
6	アロカス点滴静注235mg デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 vial 1 vial 1 本 1 本		点滴静注	30分で	1回							1回						
7	カンブ点静注40mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	60 mg/m2 1 本	66 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回							1回						
8	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	60 mg/m2 1 本 1 本	66 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回													
9	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	30分で	1回													
10	エルセハ1号輸液/2000mL1袋 アミバルン輸液/200mL1袋	1 袋 1 袋		中心静脈注射	1日で								1回						
11	フィソチ140輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	6時間で								1回						
12	オメラル注用20mg「NP」 大塚生食注2ホト100mL	1 vial 1 本		点滴静注	30分で								午前						

15
1回
1回
1回
1回 午前