

診療科	外科
レジメン名称	FOLFOX+Nivolumab(胃癌)
パスID	00001242
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

L-OHP 85mg/m<sup>2</sup>, LV 400mg/m<sup>2</sup>, 5FU 400mg/m<sup>2</sup>, 5FU 2400mg/m<sup>2</sup>/2日 (DAY1-2)

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	7ロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーフ	1本				
3	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	オキシド点滴静注20mg	240 mg	240 mg			
4	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
6	エルフラット点滴静注液100mg	85 mg/m <sup>2</sup>	93.5 mg/m <sup>2</sup>	ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
	レボレチナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial				
7	レボレチナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial		ポート用(中心静脈注射)	5分で	1回
	フルオウラシル注250mg「トーフ」	400 mg/m <sup>2</sup>	440 mg/m <sup>2</sup>			
8	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		ポート用(中心静脈注射)	46時間で	1回
	フルオウラシル注250mg「トーフ」	2400 mg/m <sup>2</sup>	3300 mg/m <sup>2</sup>			
	生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20ml/	0 mL				