

診療科	外科
レジメン名称	CDDP+TS-1療法（入院）
パスID	00000149
1クール	35日間
最大クール数	制限無し

備考

*TS-1は 投与量：80mg/m²（分2）、投与日：day1~21（2週休薬） で内服。
※ 血液学的毒性や全身状態を考慮して、投与量を変更する場合あり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						8
1	フルカリック2号輸液/1003mL1キット	1 袋		中心静脈注射	24時間で	1回
2	フィジオ140輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回
3	ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		点滴静注	15分で	1回
	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本				
4	フィジオ140輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	
	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
5	ラクテックG輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	
6	光糖液5%/5%500mL1瓶	1 本		点滴静注	2時間で	
7	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	60 mg/m ²	66 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回
	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	1 本				
8	光糖液5%/5%500mL1瓶	1 本		点滴静注	2時間で	1回
9	ラクテックG輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回