

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 診療科    | 外科                |
| レジメン名称 | ベクティビックス+mFOLF0X6 |
| パスID   | 00000237          |
| 1クール   | 14日間              |
| 最大クール数 | 制限無し              |

備考

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名   | 投与量              | 上限値        | 投与方法         | 投与時間  | Day |
|-----|---|------------------|------------|--------------|-------|-----|
|     |   |                  |            |              |       | 1   |
| 1   | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m                         | 1本               |            | ポート用(中心静脈注射) | 5時間で  | 1回  |
| 2   | アロカス点滴静注235mg                                     | 1 vial           |            | ポート用(中心静脈注射) | 30分で  | 1回  |
|     | パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ<br>デキサル注射液6.6mg(2mL/瓶) | 1本<br>1 vial     |            |              |       |     |
| 3   | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m                         | 1本               |            | ポート用(中心静脈注射) | 1時間で  | 1回  |
|     | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m<br>ベクティビックス点滴静注100mg    | 1本<br>6 mg/Kg    | 6.6 mg/Kg  |              |       |     |
| 4   | 大塚糖液5%/5%250mL1袋                                  | 1袋               |            | ポート用(中心静脈注射) | 2時間で  | 1回  |
|     | エルフラット点滴静注液100mg                                  | 85 mg/m2         | 93.5 mg/m2 |              |       |     |
| 5   | 大塚糖液5%/5%250mL1袋                                  | 1袋               |            | ポート用(中心静脈注射) | 2時間で  | 1回  |
|     | レボリナト点滴静注用100mg「NK」<br>レボリナト点滴静注用25mg「NK」         | 0 vial<br>0 vial |            |              |       |     |
| 6   | フルオウテシル注250mg「トーワ」                                | 400 mg/m2        | 440 mg/m2  | ポート用(中心静脈注射) | 5分で   | 1回  |
|     | 光糖液5%/5%100mL1瓶                                   | 50 mL            |            |              |       |     |
| 7   | フルオウテシル注250mg「トーワ」                                | 2400 mg/m2       | 3300 mg/m2 | ポート用(中心静脈注射) | 46時間で | 1回  |
|     | 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20mL/                         | 0 mL             |            |              |       |     |