

診療科	外科
レジメン名称	アバステン(ベバシズマブ)+mFOLFFOX6
パスID	00000244
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

ベバシズマブは初回は90分、2回目以降は60分、3回目以降は30分、で投与することも可。  
放射線を併用することもあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶)	1本 1 vial				
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	1.5時間で	1回
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一・	5 mg/Kg	5.5 mg/Kg			
4	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	エルブラット点滴静注液100mg	85 mg/m2	93.5 mg/m2			
5	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	レボチリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial				
6	レボチリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial		ポート用(中心静脈注射)	5分で	1回
	フルオウテシル注250mg「ト-ワ」	400 mg/m2	440 mg/m2			
7	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		ポート用(中心静脈注射)	46時間で	1回
	フルオウテシル注250mg「ト-ワ」	2400 mg/m2	3300 mg/m2			
	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20mL/	0 mL				