

診療科	外科
レジメン名称	ベクティビックス+FOLFIRI
パスID	00000257
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

消化器癌の広場（サイト） イリノテカン：180mg/m²
他の参考レジメン イリノテカン：150mg/m²
当院では状況に応じて対応する（宇田川医師）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本				
	デキスト注射液6.6mg(2mL/瓶)	1 vial				
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	1時間で	1回
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本				
4	ベクティビックス点滴静注100mg	6 mg/Kg	6.6 mg/Kg	ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
	レボネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial				
5	レボネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	カンプト点滴静注40mg	180 mg/m2	198 mg/m2			
6	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本		ポート用(中心静脈注射)	5分で	1回
	フルオウテシル注250mg「トワ」	400 mg/m2	440 mg/m2			
7	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		ポート用(中心静脈注射)	46時間で	1回
	フルオウテシル注250mg「トワ」	2400 mg/m2	3300 mg/m2			
	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20mL/	0 mL				