

診療科	外科
レジメン名称	アバスチン(ペバシズマブ)+XELOX
パスID	00000261
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> p.o. day1(夕)~day15(朝)  
ペバシズマブ: 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮して投与可

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	生理食塩液バック「フー」/250mL1袋(2	1袋		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
3	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1本		ポート用(中心静脈注射)	90分で	1回
	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一・	7.5 mg/Kg	8.25 mg/Kg			
4	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本				
	エルゾラット点滴静注液100mg	130 mg/m <sup>2</sup>	143 mg/m <sup>2</sup>			