

診療科	外科
レジメン名称	アバスチン(ペバシズマブ)+XE L I R I
パスID	00000272
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ゼローダ 1600mg/m² p.o. day1(夕)~day15(朝)
ペバシズマブ: 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮して投与可

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) アロカス点滴静注235mg パロセトン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本 1 vial 1 vial 1本		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
3	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一・ 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	7.5 mg/Kg 1本	8.25 mg/Kg	ポート用(中心静脈注射)	90分で	1回
4	カンプト点滴静注40mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	200 mg/m2 1本	220 mg/m2	ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回