

診療科	外科
レジメン名称	FOLFIRI
パスID	00000283
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

消化器癌の広場（サイト） イリノテカン：180mg/m²
 他の参考レジメン イリノテカン：150mg/m²
 当院では状況に応じて対応する（宇田川医師）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用（中心静脈注射）	5時間で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用（中心静脈注射）	30分で	1回
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1本				
	デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶)	1 vial				
	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本				
3	カンブ点滴静注40mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	180 mg/m2 1本	198 mg/m2	ポート用（中心静脈注射）	2時間で	1回
4	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋		ポート用（中心静脈注射）	2時間で	1回
	シホリナト点滴静注用100mg「NK」 シホリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial 0 vial				
5	フルオウテシル注250mg「トーワ」 光糖液5%/5%100mL1瓶	400 mg/m2 50 mL	440 mg/m2	ポート用（中心静脈注射）	5分で	1回
6	フルオウテシル注250mg「トーワ」 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/	2400 mg/m2 0 mL	3960 mg/m2	ポート用（中心静脈注射）	46時間で	1回