

診療科	外科
レジメン名称	F P 療法
パスID	00000313
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

放射線療法併用のため、投与量の減量・投与日数の短縮をする場合あり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	ソルデ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	08:00
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1 本		点滴静注	2時間で	10:00
3	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ フルオウテシル注250mg「トワ」	1 本 800 mg/m2	880 mg/m2	持続 点滴静注	1日で	12:00
4	デキザート注射液6.6mg(2ml/瓶) アロキス点滴静注235mg パノセトン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 vial 1 vial 1 本 1 本		点滴静注	30分で	1回
5	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ シスラチン点滴静注10mg「マルコ」	1 本 80 mg/m2	80 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回
6	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ プロセト注20mg「トワ」	1 本 1 A		点滴静注	2時間で	1回
7	ソルデ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回
8	ソルデ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回