

診療科	外科
レジメン名称	FOLFOXIRI + BV
パスID	00000582
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考
大腸癌に対する化学療法

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	10分で	1回
2	ゲラセトン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		点滴静注	30分で	1本目
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2A				
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1vial				
	70カス点滴静注235mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1vial 1本				
3	ベパシマブBS点滴静注100mg「第一」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	5 mg/Kg 1本	5.5 mg/Kg	点滴静注	90分で	2本目
4	カプト点滴静注40mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋	165 mg/m2 1袋	180 mg/m2	点滴静注	90分で	3本目
5	エルラット点滴静注液100mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋	85 mg/m2 1袋	95 mg/m2	点滴静注	120分で	5本目
6	レボリナト点滴静注用100mg「NK」 大塚糖液5%/5%250mL1袋	0 mg 1袋		点滴静注	120分で	4本目
7	フルオウテシル注250mg「ト-ワ」 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	3200 mg/m2 2A	3500 mg/m2	精密持続点滴	48時間で	6本目
8	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		ヘパリンロック	医師の指示	1回