

診療科	外科
レジメン名称	AI療法 (悪性肉腫)
パスID	00000610
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考
ドキシソルピシン、イホスファミド療法

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day					
						0	1	2	3	4	5
1	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1袋 2A		点滴静注	4時間で	4回					
2	アロカス点滴静注235mg 大塚生食注2ホ-ト100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で		1回				
3	デキソト注射液6.6mg (2ml/瓶) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ」 大塚生食注2ホ-ト100mL	1 vial 1本 1本		点滴静注	30分で		1回				
4	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ソルテム1輸液/500mL1袋	30 mg/m2 1袋	40 mg/m2	中心静脈注射	2時間で		1回				
5	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	2時間で		1回				
6	注射用イボイト 1g 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml/)	2 g/m2 1本	3 g/m2	点滴静注	2時間で		1回				
7	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	3時間で		6回				
8	デキソト注射液6.6mg (2ml/瓶) 大塚生食注2ホ-ト100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で			1回			
9	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ソルテム1輸液/500mL1袋	30 mg/m2 1袋	40 mg/m2	中心静脈注射	2時間で			1回			
10	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	2時間で			1回			
11	注射用イボイト 1g 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml/)	2 g/m2 1本	3 g/m2	点滴静注	2時間で			1回			
12	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	3時間で			6回			
13	デキソト注射液6.6mg (2ml/瓶) 大塚生食注2ホ-ト100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で				1回		
14	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	2時間で				1回		
15	注射用イボイト 1g 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml/)	2 g/m2 1本	3 g/m2	点滴静注	2時間で				1回		
16	ソルテム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管 ロミキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	3時間で				6回		
17	デキソト注射液6.6mg (2ml/瓶) 大塚生食注2ホ-ト100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で					1回	
18	注射用イボイト 1g 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml/)	2 g/m2 1本	3 g/m2	点滴静注	2時間で					1回	

19	ルテム1輸液/500mL1袋 マイロン静注7%/20mL1管 ウロキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	3時間で					6回	
20	テキート注射液6.6mg(2ml/瓶) 大塚生食注2ホート100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で						1回
21	ルテム1輸液/500mL1袋 マイロン静注7%/20mL1管 ウロキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	2時間で						1回
22	注射用体イト1g 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	2g/m2 1本	3g/m2	点滴静注	2時間で						1回
23	ルテム1輸液/500mL1袋 マイロン静注7%/20mL1管 ウロキサン注100mg	1袋 2A 2A		点滴静注	3時間で						6回