

診療科	外科
レジメン名称	サイラムザ+FOLFIRI
パスID	00000685
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

消化器癌の広場（サイト） イリノテカン：180mg/m²
他の参考レジメン イリノテカン：150mg/m²
当院では状況に応じて対応する（宇田川医師）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用（中心静脈注射）	5時間で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用（中心静脈注射）	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ	1本				
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用（中心静脈注射）	1時間で	1回
	生理食塩液パ「ク」「フソ-」/250mL1袋(2	1袋				
4	サイラムザ点滴静注100mg	8 mg/Kg	20 mg/Kg	点滴静注	10分で	1回
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		ポート用（中心静脈注射）	2時間で	1回
	カンフト点滴静注40mg	140 mg/m2	198 mg/m2			
6	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本		ポート用（中心静脈注射）	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
	レボネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 mg				
7	レボネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 mg		ポート用（中心静脈注射）	5分で	1回
	フルオウラシル注250mg「ト-ワ」	400 mg/m2	440 mg/m2			
8	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		ポート用（中心静脈注射）	46時間で	1回
	フルオウラシル注250mg「ト-ワ」	2400 mg/m2	3000 mg/m2			
	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	0 mL				