

診療科	外科
レジメン名称	PTX+アバスタチン(ベバシズマブ)
パスID	00000834
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考
進行再発乳癌に対しての化学療法
パクリタキセル投与30分前にレスタミン50mg内服あり

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ファミジン静注液20mg「サワイ」	1 vial 1本 1A		点滴静注	30分で	1回							1回						
2	ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 大塚生食注TN/50mL1キット	1本 1本		点滴静注	30分で	1回							1回						
3	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2)	80 mg/m2 1袋	90 mg/m2	点滴静注	60分で	1回							1回						
4	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	10 mg/Kg 1本	12 mg/Kg	点滴静注	90分で	1回													
5	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	30分で	1回							1回						

15
1回
1回
1回
1回
1回