

| | |
|--------|--------------|
| 診療科 | 外科 |
| レジメン名称 | Cmab+FOLFIRI |
| パスID | 00000936 |
| 1クール | 14日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考

消化器癌の広場（サイト） イリノテカン：180mg/m²
他の参考レジメン イリノテカン：150mg/m²
当院ではカンプト：150mg/m²を採用する（宇田川医師）

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|--------------|-------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) | 1本 | | ポート用（中心静脈注射） | 5時間で | 1回 |
| 2 | 大塚生食注TN/50mL1キット | 1本 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| | ホ ^レ ラミン注5mg | 1A | | | | |
| | デ ^キ キート注射液1.65mg(0.5ml/管) | 3A | | | | |
| 3 | 生理食塩液ハ ^ク 「フソ-」/250mL1袋(2 ア ^レ ビ ^タ ックス注射液100mg | 1袋 500 mg/m ² | 550 mg/m ² | ポート用（中心静脈注射） | 2時間で | 1回 |
| 4 | ア ^ロ カス点滴静注235mg | 1 vial | | ポート用（中心静脈注射） | 1時間で | 1回 |
| | デ ^キ キート注射液1.65mg(0.5ml/管) | 1A | | | | |
| | ハ ^ロ ロセト ^ン 静注0.75mg/2mLシリンジ「ト ^ワ | 1本 | | | | |
| | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) | 1本 | | | | |
| 5 | 大塚糖液5%/5%250mL1袋 | 1袋 | | ポート用（中心静脈注射） | 2時間で | 1回 |
| | ホ ^レ ホ ^レ リナ ^ト 点滴静注用100mg「NK」 | 0 vial | | | | |
| | ホ ^レ ホ ^レ リナ ^ト 点滴静注用25mg「NK」 | 0 vial | | | | |
| 6 | カン ^プ ト点滴静注40mg | 150 mg/m ² | 165 mg/m ² | ポート用（中心静脈注射） | 2時間で | 1回 |
| | 光糖液5%/5%500mL1瓶 | 1本 | | | | |
| 7 | フル ^オ ウ ^ラ シル注250mg「ト ^ワ | 400 mg/m ² | 440 mg/m ² | ポート用（中心静脈注射） | 5分で | 1回 |
| | 光糖液5%/5%100mL1瓶 | 50 mL | | | | |
| 8 | フル ^オ ウ ^ラ シル注250mg「ト ^ワ | 2400 mg/m ² | 3300 mg/m ² | ポート用（中心静脈注射） | 46時間で | 1回 |
| | 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/ | 0 mL | | | | |