

診療科	産婦人科
レジメン名称	w-CPT-P
パスID	00000016
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

CDDPは17~20mg/m<sup>2</sup>で行う  
 胸腔内投与の場合はCDDPは原液でも可  
 Day8、15は骨髄抑制の回復の程度によってはスキップされることもあり  
 原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2)	1袋		点滴静注	30分で	1回								1回					
2	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2)	1袋		点滴静注	30分で	1回								1回					
	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial																	
3	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A		点滴静注	1.5時間で	1回								1回					
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1本																	
4	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		点滴静注	1.5時間で	1回								1回					
	フロセト注20mg「トワ」	0.5 A																	
5	アスパラカリウム注10mEq	1 A		点滴静注	1.5時間で	1回								1回					
	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	1本	55 mg/m2																
6	カンブ点注40mg	50 mg/m2	55 mg/m2	点滴静注	1.5時間で	1回								1回					
	フロセト注20mg「トワ」	0.5 A																	
7	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	1本		点滴静注	2時間で	1回								1回					
	シスプラチン点注10mg「マルコ」	20 mg/m2	22 mg/m2																
7	ソルデム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	1.5時間で	1回								1回					
	ブリンパラン注射液10mg	1 A																	

15
1回
1回
1回
1回
1回
1回