

診療科	産婦人科
レジメン名称	TC+BEV (アロカリス追加)
パスID	00000020
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

アパスタチン→初回投与は90分かけてdiv、2回目は60分でも可、それ以降は30分でも可
 CBDCA:AUC=5.5~6
 アパスタチン:7.5~15mg/kg
 術後28日以内の投与は不可のため1コース目はPTX+CBDCAとなり、2コース目よりアパスタチンが追加される。
 TC+BEV2~6コース終了後、BEV単剤7~22コースへ

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mデキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)フアモシジン静注液20mg「サワイ」)	1本 3 vial 1 A		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mアロカリス点滴静注235mgハロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ」)	1本 1 vial 1本		点滴静注	30分で	1回
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mブリンペラン注射液10mg)	1本 1 A		点滴静注	30分で	1回
4	光糖液5%/5%500mL1瓶 ハクタキセル注30mg/5mL「NK」	1本 175 mg/m2	192.5 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
5	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」)	1袋 6 mg(AUC)	6.6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回
6	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mアパスタチン点滴静注用100mg/4mL)	1本 15 mg/Kg	16.5 mg/Kg	点滴静注	90分で	1回