

診療科	産婦人科
レジメン名称	PLD+BEV
パスID	00000045
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考
前治療が1レジメンであるか、もしくは6コース以内の症例に限る
ドキシルは1mg/分を超えない速度で
アバスタチンは30～90分で投与

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	光糖液5%/5%100mL1瓶 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1本 1 vial		持続 点滴静注	30分で	1回													
2	大塚糖液5%/5%250mL1袋 ドキシル注20mg	1袋 40 mg/m2	44 mg/m2	持続 点滴静注	1.5時間で	1回													
3	7α スチン点滴静注用100mg/4mL 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	10 mg/Kg 80 mL	11 mg/Kg	持続 点滴静注	1.5時間で	1回													
4	プリパラン注射液10mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1 A 1本		持続 点滴静注	30分で	1回													
5	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		持続 点滴静注	30分で														
6	7α スチン点滴静注用100mg/4mL 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	10 mg/Kg 80 mL	11 mg/Kg	持続 点滴静注	1.5時間で														
7	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		持続 点滴静注	30分で														

15
1回
1回
1回