

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 診療科    | 産婦人科               |
| レジメン名称 | PLD+CBDCA（アロカリス追加） |
| パスID   | 00000051           |
| 1クール   | 28日間               |
| 最大クール数 | 制限無し               |

備考  
ドキシルは1mg/minを超えない速度で

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名   | 投与量                                 | 上限値          | 投与方法    | 投与時間 | Day |
|-----|---|-------------------------------------|--------------|---------|------|-----|
|     |   |                                     |              |         |      | 1   |
| 1   | 光糖液5%/5%100mL1瓶<br>デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶)<br>デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)<br>アロカリス点滴静注235mg<br>パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ | 1本<br>1 vial<br>2 A<br>1 vial<br>1本 |              | 持続 点滴静注 | 30分で | 1回  |
| 2   | 大塚糖液5%/5%250mL1袋<br>ドキシル注20mg   | 1袋<br>30 mg/m2                      | 33 mg/m2     | 持続 点滴静注 | 1時間で | 1回  |
| 3   | 大塚糖液5%/5%250mL1袋<br>カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」  | 1袋<br>5 mg (AUC)                    | 5.5 mg (AUC) | 持続 点滴静注 | 1時間で | 1回  |
| 4   | 光糖液5%/5%100mL1瓶<br>グリルパラン注射液10mg  | 1本<br>1 A                           |              | 持続 点滴静注 | 30分で | 1回  |