

診療科	産婦人科
レジメン名称	GEM+CBDCA（アロカリス追加）
パスID	00000075
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考
GEMは800~1000mg/m²・CBDCAは3~4=AUCで調整

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	1本 1 vial 2 A 1 vial 1本		持続 点滴静注	30分で	1回								
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ジエムザール注射用200mg	1本 1000 mg/m ²	1100 mg/m ²	持続 点滴静注	30分で	1回								
3	生理食塩液パツク「フソ-」/250mL1袋(2) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	1袋 4 mg(AUC)	4.4 mg(AUC)	持続 点滴静注	1.5時間で	1回								
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ブリンパラン注射液10mg	1本 1 A		持続 点滴静注	30分で	1回								
5	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1 vial 1本		持続 点滴静注	30分で									1回
6	ジエムザール注射用200mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1000 mg/m ² 1本	1100 mg/m ²	持続 点滴静注	30分で									1回
7	ブリンパラン注射液10mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1 A 1本		持続 点滴静注	30分で									1回