

診療科	産婦人科
レジメン名称	AI療法（入院のみ、アロカリス追加）
パスID	00001153
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考
メスナをイホマイド投与直前に0.5g/m²、4時間後、8時間後に0.5g/m²ずつ経静脈投与。
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する。
Day5～6にジューラスタを使用する。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
						1	2	3
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) デキスト注射液6.6mg(2mL/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5mL/管) アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1本 1 vial 2 A 1 vial 1本		点滴静注	30分で	1回		
2	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) カドミチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回		
3	注射用イボマイト 1g 生理食塩液ハック「フー」/250mL1袋(20mL)	2.5 g/m2 1袋	3 g/m2	点滴静注	1時間で	1回		
4	生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL)	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回		
5	ドキルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 大塚蒸留水/20mL1管	25 mg/m2 10 mL	30 mg/m2	静脈注射(ワンショット)		1回		
6	生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL)	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回		
7	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL) マイロン静注7%/20mL1管 プロセトロン注20mg「トワ」 アスバラカリウム注10mEq	1本 1 A 0.5 A 1 A		点滴静注	2時間で	1回		
8	ウルテム3A輸液/500mL1袋 ブリンパラン注射液10mg マイロン静注7%/20mL1管	1袋 1 A 1 A		点滴静注	2時間で	1回		
9	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) カドミチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回		
10	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL) マイロン静注7%/20mL1管 プロセトロン注20mg「トワ」 アスバラカリウム注10mEq	1本 1 A 0.5 A 1 A		点滴静注	2時間で	1回		
11	マイロン静注7%/20mL1管 ウルテム3A輸液/500mL1袋	1 A 1袋		点滴静注	2時間で	1回		
12	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) カドミチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回		
13	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回		
14	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) デキスト注射液6.6mg(2mL/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5mL/管) マイロン静注7%/20mL1管	1本 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	30分で		1回	1回
15	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100mL) カドミチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で		1回	1回
16	注射用イボマイト 1g 生理食塩液ハック「フー」/250mL1袋(20mL)	2.5 g/m2 1袋	3 g/m2	点滴静注	1時間で		1回	1回
17	生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL)	10 mL		静脈注射(ワンショット)			1回	1回
18	大塚蒸留水/20mL1管 ドキルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	10 mL 25 mg/m2	30 mg/m2	静脈注射(ワンショット)			1回	1回
19	生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL)	10 mL		静脈注射(ワンショット)			1回	1回

20	フロゼット [®] 注20mg「ト-7」 アスパ [®] ラカリウム注10mEq マイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/	0.5 A 1 A 1 A 1 本		点滴静注	2時間で		1回	1回
21	マイロン静注7%/20mL1管 ブリンベ [®] ラン注射液10mg リルテ [®] M3A輸液/500mL1袋	1 A 1 A 1 袋		点滴静注	2時間で		1回	1回
22	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ウロミキサン注100mg	1 本 0 mg		点滴静注	30分で		1回	1回
23	フロゼット [®] 注20mg「ト-7」 アスパ [®] ラカリウム注10mEq マイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/	0.5 A 1 A 1 A 1 本		点滴静注	2時間で		1回	1回
24	リルテ [®] M3A輸液/500mL1袋 マイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		点滴静注	2時間で		1回	1回
25	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ウロミキサン注100mg	1 本 0 mg		点滴静注	30分で		1回	1回
26	ヘパ [®] フラッシュ100単位/mLシリンジ [®] 5mL	1 本		静脈注射 (ワンショット)			1回	1回