

診療科	産婦人科
レジメン名称	ドキソルピシン単剤
パスID	00001160
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考

AI療法と比較して有害事象が軽微。OSはAI療法と同等、PFSはやや劣る。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) デキソ [®] 注射液6.6mg(2ml/瓶) デキソ [®] 注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン [®] 静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ」	1本 1 vial 2 A 1本		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/)	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回
3	ドキソ [®] リン [®] 塩酸塩注射用10mg「NK」 大塚蒸留水/20mL1管	75 mg/m ² 10 mL	80 mg/m ²	静脈注射(ワンショット)		1回
4	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/)	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回
5	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) プレドニゾロン [®] 注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	30分で	1回