

診療科	産婦人科
レジメン名称	DC(アロカリス)+BEV
パスID	00001529
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

TC療法にて痺れの有害事象が高度である場合などに適用（痺れの軽減を図る）。但し白血球減少は高度になる。Ⅲ期以上に適応

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		持続 点滴静注	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A				
	アロカリス点滴静注235mg	1 vial				
3	生理食塩液点滴静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ	1本		持続 点滴静注	1時間で	1回
	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(250mL)	1袋				
4	ドキシゲル点滴静注20mg/1mL「NK」	70 mg/m2	77 mg/m2	持続 点滴静注	1時間で	1回
	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(250mL)	1袋				
5	カルボプラチン点滴静注50mg「NK」	5.5 mg(AUC)	6 mg(AUC)	持続 点滴静注	1時間で	1回
	ペパシマブBS点滴静注100mg「第一」	15 mg/Kg	16.5 mg/Kg			
6	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		点滴静注	90分で	1回
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本				
6	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		持続 点滴静注	30分で	1回
	アリンベラン注射液10mg	1 A				