

診療科	産婦人科
レジメン名称	BEP
パスID	00000175
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考  
卵巣胚細胞腫瘍のレジメン

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液ハッゲ「フー」/250mL1袋(2 フロリス点滴静注235mg	1 袋 1 vial		点滴静注	30分で	1回													
2	生理食塩液ハッゲ「フー」/250mL1袋(2 デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1 袋 1 vial 2 A 1 本		点滴静注	30分で	1回													
3	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注100mg「サント」	1 本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回													
4	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m フロセイト注20mg「トワ」	1 本 0.5 A		点滴静注	*点滴速度 Oml/hr	1回													
5	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ シスラチン点滴静注10mg「マルコ」	1 本 20 mg/m2	22 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回													
6	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) フロセイト注20mg「トワ」 アスバカリウム注10mEq	1 袋 0.5 A 1 A		点滴静注	1.5時間で	1回													
7	ソルテム3A輸液/500mL1袋 ブリンペラン注射液10mg	1 袋 1 A		点滴静注	1.5時間で	1回													
8	ハッフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1 本		静脈注射(ワンショット)		1回													
9	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管) デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 本 2 A 1 vial		点滴静注	1時間で		1回												
10	大塚生食注TN/50mL1キット ブレイ注射用5mg	1 本 30 mg	33 mg	点滴静注	30分で		1回												
11	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注100mg「サント」	1 本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で		1回												
12	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m フロセイト注20mg「トワ」	1 本 0.5 A		点滴静注	*点滴速度 Oml/hr		1回												
13	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ シスラチン点滴静注10mg「マルコ」	1 本 20 mg/m2	22 mg/m2	点滴静注	1時間で		1回												
14	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) フロセイト注20mg「トワ」 アスバカリウム注10mEq	1 袋 0.5 A 1 A		点滴静注	1.5時間で		1回												
15	ソルテム3A輸液/500mL1袋 ブリンペラン注射液10mg	1 袋 1 A		点滴静注	1.5時間で		1回												
16	ハッフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1 本		静脈注射(ワンショット)			1回												
17	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管)	1 本 1 vial 2 A		点滴静注	1時間で			1回	1回	1回									
18	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注100mg「サント」	1 本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で			1回	1回	1回									
19	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m フロセイト注20mg「トワ」	1 本 0.5 A		点滴静注	*点滴速度 Oml/hr			1回	1回	1回									
20	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注100mg「サント」	1 本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で			1回	1回	1回									

No	薬剤名	20 mg/m <sup>2</sup>	22 mg/m <sup>2</sup>	薬剤形態	投与時間												
21	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) フロセミド注20mg「トーフ」 アスパラカリウム注10mEq	1 袋 0.5 A 1 A		点滴静注	1.5時間で			1回	1回	1回							
22	カルデム3A輸液/500mL1袋 グリルペラン注射液10mg	1 袋 1 A		点滴静注	1.5時間で			1回	1回	1回							
23	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1 本		静脈注射 (ワンショット)				1回	1回								
24	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		持続 点滴静注	30分で									1回			
25	大塚生食注TN/50mL1キット ブレン注射用5mg	1 本 30 mg	33 mg	持続 点滴静注	30分で									1回			
26	大塚生食注TN/50mL1キット グリルペラン注射液10mg	1 本 1 A		持続 点滴静注	30分で									1回			



	1回
	1回
	1回