

診療科	産婦人科
レジメン名称	キイトルーダ3w+TC（アロカリス追加）+Bev
パスID	00001763
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考
 進行または再発の子宮頸癌
 キイトルーダ3w+TC（アロカリス追加）+Bev 6クール実施目安で、キイトルーダ3w+Bev維持療法へ移行
 レスタミン錠10mg 5錠 分1 1日分 ※パクリタキセル投与30分前までに服用 ※ 薬剤部へ → 早期払い出し（総点滴時間長いため）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) フマリン静注20mg「サワイ」	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本 1 vial 1本		点滴静注	30分で	1回
3	キイトルーダ点滴静注100mg 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	200 mg 1本	220 mg	点滴静注	30分で	1回
4	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	1本 175 mg/m2	192.5 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
5	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 カルボプラチン点滴静注50mg「NK」	1袋 5 mg(AUC)	6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回
6	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ベバンジアムBS点滴静注100mg「第一」	1本 15 mg/Kg	16.5 mg/Kg	点滴静注	90分で	1回
7	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンパラン注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	15分で	1回
8	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	30分で	1回