

診療科	産婦人科
レジメン名称	CDDP+IFM (入院のみ)
パスID	00000186
1クール	28日間
最大クール数	6回まで

備考  
子宮頸癌  
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) メイロン静注7%/20mL1管	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	2時間で	1回			
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ メイロン静注7%/20mL1管 パロセチン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本 1 A 1本		点滴静注	1時間で	1回			
3	注射用イリテクト1g 生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2	1.5 g 1袋	1.65 g	点滴静注	1時間で	1回			
4	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m フロセチン注20mg「トワ」	1本 0.5 A		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回			
5	フロセチン注20mg「トワ」 アスパラカリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	0.5 A 1 A 1 A 1本		点滴静注	2時間で	1回			
6	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ロミタキソン注100mg	1本 300 mg		点滴静注	30分で	1回			
7	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ロミタキソン注100mg	1本 300 mg		点滴静注	30分で	1回			
8	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ ソルテム3A輸液/500mL1袋	50 mg/m2 1本 1袋	55 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回			
9	メイロン静注7%/20mL1管 ブリンパラン注射液10mg	1 A 1 A		点滴静注	4時間で	1回			
10	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ロミタキソン注100mg	1本 300 mg		点滴静注	0.5時間で	1回			
11	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回			
12	ソルテム3A輸液/500mL1袋 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) メイロン静注7%/20mL1管	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回
13	注射用イリテクト1g 生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2	1.5 g 1袋	1.65 g	点滴静注	1時間で		1回	1回	1回
14	フロセチン注20mg「トワ」 アスパラカリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ メイロン静注7%/20mL1管	0.5 A 1 A 1 A 1本 1 A		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回
15	ブリンパラン注射液10mg ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 A 1袋		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回
16	フロセチン注20mg「トワ」 アスパラカリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管	0.5 A 1 A 1 A		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回

	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1本						
17	ヘパ フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本	静脈注射 (ワンショット)			1回	1回	1回