

診療科	産婦人科
レジメン名称	CYVADIC
パスID	00000215
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考
適応：子宮肉腫
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)	1袋 1 vial 2 A		点滴静注	30分で	1回				
2	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本 1本		点滴静注	30分で	1回				
3	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/ オンピン注射用1mg	15 mL 1 mg/m2	1.1 mg/m2	静脈注射(ワンショット)		1回				
4	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/ 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンベラン注射液10mg	5 mL 1本 1 A		点滴静注	30分で	1回				
5	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンベラン注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	30分で	1回				
6	ハパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回				
7	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ダカルバジン注用100 大塚蒸留水/20mL1管	70 mL 200 mg/m2 1 A	220 mg/m2	点滴静注	30分で	1回				
8	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/ テラビジン注射用10mg	30 mL 40 mg/m2	44 mg/m2	静脈注射(ワンショット)			1回			
9	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/ ハパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	5 mL 1本		静脈注射(ワンショット)			1回			
10	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)	1本 1 vial 2 A		点滴静注	30分で		1回			
11	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)	1本 1 vial 2 A		点滴静注	30分で		1回			
12	大塚生食注TN/50mL1キット 注射用インドキサン100mg	1本 400 mg/m2	440 mg/m2	点滴静注	30分で		1回			
13	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で		1回			
14	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンベラン注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	30分で		1回			
15	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ダカルバジン注用100 大塚蒸留水/20mL1管	70 mL 200 mg/m2 1 A	220 mg/m2	点滴静注	30分で		1回			
16	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)	1本 1 vial 2 A		点滴静注	30分で			1回	1回	
17	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンベラン注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	30分で			1回	1回	
18	ハパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射(ワンショット)			1回	1回		
19	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ダカルバジン注用100 大塚蒸留水/20mL1管	70 mL 200 mg/m2 1 A	220 mg/m2	点滴静注	30分で			1回	1回	
20	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサル注射液1.65mg(0.5ml/管)	1本 1 vial 2 A		点滴静注	30分で					1回
21	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/ オンピン注射用1mg	15 mL 1 mg/m2	1.1 mg/m2	静脈注射(ワンショット)						1回

22	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	5 mL		静脈注射(ワンショット)					1回
23	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ブリンペラン注射液10mg	1本 1A		点滴静注	30分で				1回
24	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ダカバジン注用100 大塚蒸留水/20mL1管	70 mL 200 mg/m2 1A	220 mg/m2	点滴静注	30分で				1回