

診療科	産婦人科
レジメン名称	TP (入院のみ、アロカリス追加)
パスID	00000526
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

カルボプラチンアレルギーの人に代替としてシスプラチンを使用したレジメン。
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 フマリン静注20mg「サワイ」 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	1 袋 1 A 1 vial 2 A		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	1 袋 1 vial 1 本		点滴静注	30分で	1回
3	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ ハクシタセル注30mg/5mL「NK」	1 本 175 mg/m2	180 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
4	プロセト注20mg「トーワ」 大塚生食注TN/50mL1キット	0.5 A 1 本		点滴静注	0分で	1回
5	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	75 mg/m2 1 本	80 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回
6	プロセト注20mg「トーワ」 アスハラカリウム注10mEq ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	0.5 A 1 A 1 袋		点滴静注	2時間で	1回
7	プリンペラン注射液10mg ソルデム3A輸液/500mL1袋	1 A 1 袋		点滴静注	2時間で	1回