

診療科	産婦人科
レジメン名称	w-DC (アロカリス追加)
パスID	00000527
1クール	7日間
最大クール数	制限無し

備考

子宮体癌、卵巣癌にて放射線同時併用療法時に使用する。TC療法にて痺れの有害事象が高度である場合などに適用（痺れの軽減を図る）。但し白血球減少は高度になる。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1本 1 vial 2 A 1 vial 1本		持続 点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2) ドセタセル点滴静注液20mg/1mL「NK」	1袋 20 mg	20 mg	持続 点滴静注	1時間で	1回
3	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	1袋 2 mg (AUC)	2.1 mg (AUC)	持続 点滴静注	1時間で	1回
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) グリネラン注射液10mg	1本 1 A		持続 点滴静注	30分で	1回