

診療科	産婦人科
レジメン名称	TP+BEV (入院のみ、アロカリス追加)
パスID	00000904
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

7α-スチン→初回投与は90分かけてdiv、2回目は60分でも可、それ以降は30分でも可
7α-スチン:7.5~15mg/kg
コース数はPDになるまで継続可

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	7α-フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回	
2	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶 (100mL)	1本		点滴静注	30分で	1回	
	7α-キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	3 vial					
3	7α-キート注射液20mg「サワイ」	1A		点滴静注	3時間で	1回	
	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本					
	7α-クリタキセル注30mg/5mL「NK」	175 mg/m2	192.5 mg/m2				
4	7α-フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回	
5	ソルデム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	3時間で		1回
	7α-キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial					
6	7α-キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A		点滴静注	1時間で		1回
	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml)	1本					
7	アロカリス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	1時間で		1回
	7α-ロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1本					
8	7α-ロセトロン注20mg「トワ」	0.5A		静脈注射 (ワンショット)		1回	
9	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶 (500ml)	1本		点滴静注	2時間で		1回
	7α-スチン点滴静注10mg「マルコ」	50 mg/m2	55 mg				
10	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		点滴静注	2時間で		1回
	7α-ロセトロン注20mg「トワ」	0.5A					
11	7α-ラカリウム注10mEq	1A		点滴静注	2時間で		1回
	ソルデム3A輸液/500mL1袋	1袋					
12	7α-リンペラン注射液10mg	1A		点滴静注	90分で		1回
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶 (100mL)	1本					
	7α-スチン点滴静注用100mg/4mL	15 mg/Kg	16.5 mg/Kg				
12	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で		1回
	7α-リンペラン注射液10mg	1A					