

診療科	耳鼻咽喉科
レジメン名称	CDDP+RT
パスID	00000780
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

頭頸部癌に対する化学放射線療法
根治目的、術前・術後の補助いずれにも適用可
外照射と併用して標準 3W毎に1クール、標準 合計3クール
放射線治療終了後も追加3クール、合計6クールまで延長可
day1~3はイメンド内服、day2~4はデキサメサゾン8mg/day内服

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1本 1袋		中心静脈注射	7時間で	00:00			
2	KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1本 1A		中心静脈注射	4時間で	07:00			
3	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		中心静脈注射	13時間で	11:00			
4	大塚生食注TN/50mL1キット デキサ注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサ注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	1本 1 vial 2 A 1本		中心静脈注射	0.5時間で	11:00			
5	20%マンニトール注射液「YD」300mL	1袋		中心静脈注射	0.5時間で	11:30			
6	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	1袋 100 mg/m2	120 mg/m2	中心静脈注射	2時間で	12:00			
7	プリンペラン注射液10mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1 A 1本		中心静脈注射	15分で	1回	1回	1回	1回
8	20%マンニトール注射液「YD」300mL	1袋		中心静脈注射	0.5時間で	1回	1回		
9	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		ヘパリンロック	医師の指示	2回	2回	2回	2回
10	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		中心静脈注射	12時間で		00:00	00:00	
11	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		中心静脈注射	12時間で		12:00	12:00	
12	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋		中心静脈注射	12時間で				00:00