

診療科	腎臓内科
レジメン名称	エンドキサンパルス療法
パスID	00000200
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

腎不全・高齢者の場合、50%減量し、7.5mg/kg/pulseで。

①Scr1. 7-3. 4mg/dL ②Scr3. 4-5. 7mg/dL

60歳未満 ①: 15mg/kg ②12. 5mg/kg

60-70歳未満 ①: 12. 5mg/kg ②10mg/kg

70歳以上 ①10mg/kg ②7. 5mg/kg

※当疾患には適応外で使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	フル生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	3時間で	10:00
2	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2)	15 mg/Kg 1袋	16. 5 mg/Kg	点滴静注	2時間で	13:00
3	カロミキサン注100mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	0 A 1本		点滴静注	30分で	13:00
4	カロミキサン注100mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	0 A 1本		点滴静注	30分で	17:00
5	カロミキサン注100mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	0 A 1本		点滴静注	30分で	21:00
6	フル生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	4時間で	15:00
7	フル生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	4時間で	19:00