JAとりで総合医療センター
化学療法レジメン

診療科	血液内科	
レジメン名称	HyperCVAD/HD-MTX・AC療法：ALL	コース②
パスID	00000082	
1クール	21日間	
最大クール数	4回まで	

備考
ｺｰｽ②：ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄの終了１２時間後からﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ50mgを６時間ごとにIVする。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ「NK」	1 本		静脈注射（ワンショット）		朝,夕			
2	注射用ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ5mg 生理食塩液PL「ﾌｿｰ」/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ))	100 mg/m2 1 本	110 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回			
3	注射用ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ5mg 生理食塩液「ﾋｶﾘ」/500ml1瓶(500ml/瓶)	400 mg/m2 1 本	440 mg/m2	点滴静注	11時間で	1回			
4	注射用ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ5mg 生理食塩液「ﾋｶﾘ」/500ml1瓶(500ml/瓶)	500 mg/m2 1 本	550 mg/m2	点滴静注	12時間で	1回			
5	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ「NK」 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa注射用4 大塚生食注TN/50mL1ｷｯﾄ	1 本 1 vial 1 本		点滴静注	0時間で		朝,夕	朝,夕	
6	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ点滴静注液400mg「ﾃﾊﾞ」 生理食塩液「ﾋｶﾘ」/500ml1瓶(500ml/瓶)	3000 mg/m2 0 mL	3300 mg/m2	持続　点滴静注	3時間で		10:00, 20:00	10:00, 20:00	
7	ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注3mg 大塚生食注TN/50mL1ｷｯﾄ	16 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で		18:00		
8	ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注3mg 大塚生食注TN/50mL1ｷｯﾄ	8 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			00:00, 06:00, 12:00, 18:00	
9	ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注3mg 大塚生食注TN/50mL1ｷｯﾄ	8 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で				00:00, 06:00, 12:00, 18:00