

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 診療科    | 血液内科                   |
| レジメン名称 | (R-) HD-MTX・AC療法 (ML用) |
| パスID   | 00000011               |
| 1クール   | 21日間                   |
| 最大クール数 | 制限無し                   |

備考

ALLにも使用する。悪性リンパ腫ではリツキサン併用可。  
MTX12hr後からロイコホリンスキュー開始  
初回50mg/body、以降15mg/m<sup>2</sup>を6時間毎  
48時間後のMTXの血中濃度、1μmol/L以下。72時間後0.1μmol/L以下を目安。必要時ロイコホリン増量を検討。キオサイトは60歳以上の時1g/m<sup>2</sup>に減量。MTX・AraC・ス

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名   | 投与量  | 上限値                    | 投与方法          | 投与時間   | Day  |                 |                                     |   |
|-----|---|--|------------------------|---------------|--------|------|-----------------|-------------------------------------|---|
|     |   |  |                        |               |        | 1    | 2               | 3                                   | 4 |
| 1   | ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」   | 1本   |                        | 静脈注射 (ワンショット) |        | 朝, 夕 |                 |                                     |   |
| 2   | 注射用メトトレキサート5mg<br>生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100mL)                          | 100 mg/m <sup>2</sup><br>1本                | 110 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注          | 1時間で   | 1本目  |                 |                                     |   |
| 3   | 注射用メトトレキサート5mg<br>生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋 (250mL)                         | 450 mg/m <sup>2</sup><br>1袋                | 990 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注          | 11時間で  | 2本目  |                 |                                     |   |
| 4   | 注射用メトトレキサート5mg<br>生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋 (250mL)                         | 450 mg/m <sup>2</sup><br>1袋                | 990 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注          | 12時間で  | 3本目  |                 |                                     |   |
| 5   | ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」<br>ソル・メト・ロール静注用40mg<br>大塚生食注TN/50mL1キット           | 1本<br>1 vial<br>1本                         |                        | 点滴静注          | 15分で   |      | 朝, 夕            | 朝, 夕                                |   |
| 6   | シタビリン点滴静注液400mg「NIG」<br>メチルプレニオンコハク酸エステルNa注射用4<br>ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL) | 3000 mg/m <sup>2</sup><br>1 vial<br>300 mL | 3300 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注          | 3時間で   |      | 10:00,<br>20:00 | 10:00,<br>20:00                     |   |
| 7   | ロイコホリン注3mg<br>大塚生食注TN/50mL1キット  | 16 A<br>40 mL                              |                        | 点滴静注          | 0.5時間で |      | 18:00           |                                     |   |
| 8   | ロイコホリン注3mg<br>大塚生食注TN/50mL1キット  | 8 A<br>40 mL                               |                        | 点滴静注          | 0.5時間で |      |                 | 00:00,<br>06:00,<br>12:00,<br>18:00 |   |
| 9   | ロイコホリン注3mg<br>大塚生食注TN/50mL1キット  | 8 A<br>40 mL                               |                        | 点滴静注          | 0.5時間で |      |                 | 00:00,<br>06:00,<br>12:00,<br>18:00 |   |