

診療科	血液内科
レジメン名称	ABVD療法
パスID	00000013
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

ダカルバジンは副作用が強いときは、250mg/m<sup>2</sup>も可！  
年齢・全身状態により適宜減量（70歳以上：70%、75歳以上：50%など）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	5時間で	1回													
2	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 大塚生食注TN/50mL1キット	2A 1本 1本		点滴静注	30分で	1回													
3	ブレン注射用5mg ソル・コチン注射用100mg 生理食塩液パック「フソ」/250mL1袋(2)	10 mg/m <sup>2</sup> 1 vial 1袋	11 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	1回													
4	ドキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/)	25 mg/m <sup>2</sup> 0A	27.5 mg/m <sup>2</sup>	静脈注射(ワンショット)		1回													
5	エカール注射用10mg 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/)	6 mg/m <sup>2</sup> 0A	6.6 mg/m <sup>2</sup>	静脈注射(ワンショット)		1回													
6	ダカルバジン注用100 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m) 大塚蒸留水/20mL1管	375 mg/m <sup>2</sup> 1本 1A	412.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1.5時間で	1回													

15
1回
1回
1回
1回
1回
1回