

診療科	血液内科
レジメン名称	AML寛解導入療法 (AraC+IDR)
パスID	00000014
1クール	21日間
最大クール数	2回まで

備考
高齢者は、キロサイド100mg/m² day 1-5、イダマイシン12mg/m² day 1-2で施行する場合あり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
						1	2	3
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回
3	グラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンシヨット)		朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕
4	キロサイド注20mg 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管 (20ml/)	100 mg/m ² 0 mL	110 mg/m ²	精密持続点滴	24時間で	1回	1回	1回
5	イダマイシン静注用5mg 光糖液5%/5%100mL1瓶 大塚蒸留水/20mL1管	12 mg/m ² 1 本 1 A	13.2 mg/m ²	点滴静注	30分で	1回	1回	1回