

診療科	血液内科
レジメン名称	CAG療法②
パスID	00000038
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

アクリソニン14mg/m<sup>2</sup> (15-69歳)、10mg/m<sup>2</sup> (70歳以上)  
CAG終了後、状態が良好であれば、CA療法へ。  
1クールの期間は病状により短縮もする。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回										
2	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回	1回										
3	アクリソニン注射用20mg 生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m)	14 mg/m <sup>2</sup>	15.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分で	昼	昼	昼	昼										
4	フィルガスタムBS注300μgシリンジ「モナタ」(生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m))	1本		点滴静注	*点滴速度 OmL/hr	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
5	生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml)	5 mL		ヘパリンロック	医師の指示	終了時	終了時	終了時	終了時										
6	キロサイト注20mg	14 mg/m <sup>2</sup>	15.4 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射 (SC)		朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前	朝, 寝る前