

診療科	血液内科
レジメン名称	CBDCA+ETP
パスID	00000039
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

アントラサイクリンを含まず。かつ、AraC耐性白血病に対して。  
文献Ann Oncol 3 Suppl 3:39-42; 1992

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
						1	2	3
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回
3	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 大塚生食注TN/50mL1キット	2A 1本 1本		点滴静注	0.5時間で	1回		
4	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液バッグ「フソ」/250mL1袋(2)	300 mg/m2 1袋	330 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回	1回	1回
5	イトリプト点滴静注液100mg「サント」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	100 mg/m2 1本	110 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回	1回	1回