

| | |
|--------|---------------|
| 診療科 | 血液内科 |
| レジメン名称 | CHOP変法 (CHVP) |
| パスID | 00000048 |
| 1クール | 21日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考
プレドニン50mg/m² 内服 day 1～5

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|---------------|------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | ソルテム3A輸液/500mL1袋 水溶性プレドニン20mg | 1袋 3A | | 持続点滴静注 | 4時間で | 1回 |
| 2 | グラセトン静注液3mgシリンジ「サワイ」 | 1本 | | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |
| 3 | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) | 1本 | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 4 | 注射用エンドキサン100mg 生理食塩液バック「フソ-」/250mL1袋(2) | 750 mg/m ² 1袋 | 825 mg/m ² | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 5 | ドキルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/) | 50 mg/m ² 1A | 55 mg/m ² | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |
| 6 | 注射用フィルシ1mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/) | 3 mg/m ² 10 mL | 4 mg | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |