

診療科	血液内科
レジメン名称	CNS原発悪性リンパ腫（高齢者用）：維持療法
パスID	00000049
1クール	42日間
最大クール数	制限無し

備考

☆アロカリン（内服） 60mg/m² day 1～7

☆61歳以上

サイメリンは溶解後の安定性が低いため、メソトレキセートより先に施行してもよい。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	ゲラネトロン静注液3mgリンパ「サイ」	1本		静脈注射（ワンショット）		朝、夕			
2	注射用サイメリン50mg 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶（100m	40 mg/m ² 1本	44 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回			
3	注射用メソトレキセート5mg フルモ生食/1L1袋（1000ml/袋）	1000 mg/m ² 1袋	1100 mg/m ²	点滴静注	6時間で	1回			
4	和ロサト注20mg 注射用メソトレキセート5mg	40 mg 15 mg	40 mg 15 mg	髄腔内注射		1回			
5	ロイコホリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で		06:00, 12:00, 18:00		
6	ロイコホリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			00:00, 06:00, 12:00, 18:00	
7	ロイコホリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で				00:00, 06:00, 12:00