

診療科	血液内科
レジメン名称	CNS原発悪性リンパ腫（高齢者用）：寛解導入
パスID	00000050
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考
 ☆アロカチジン（内服） 60mg/m² day 1～7
 ☆ソルトロール 60mg/m² (div 1hr)、day 1～20、ソルトロール30mg/m² (div 1hr) day 21-45
 ☆61歳以上
 サイメリンは溶解後の安定性が低いため、メソトレキセートより先に施行してもよい。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ゲラネトロン静注液3mgリンパ「サワイ」	1本		静脈注射（ワンショット）		朝, 夕									朝, 夕				
2	ソルトロール静注用40mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	0 vial 1本		点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	
3	注射用サイメリン50mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	40 mg/m ² 1本	44 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回													
4	注射用メソトレキセート5mg フル生食/1L1袋(1000ml/袋)	1000 mg/m ² 1袋	1100 mg/m ²	点滴静注	6時間で	1回									1回				
5	キロサイト注20mg 注射用メソトレキセート5mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	40 mg 15 mg 3 mL	40 mg 15 mg	髄腔内注射		1回				1回					1回				
6	ロイコリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			06:00, 12:00, 18:00								06:00, 12:00, 18:00			
7	リツキマフ BS点滴静注100mg「ファイザー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ ロイコリン注3mg	375 mg/m ² 0 mL 9 A	412 mg/m ²	点滴静注	3時間で			1回									1回		
8	ロイコリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			00:00, 06:00, 12:00, 18:00									00:00, 06:00, 12:00, 18:00		
9	ロイコリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	9 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			00:00, 06:00, 12:00									00:00, 06:00, 12:00		

15	16	17	18	19	20	21	22	23
					朝,夕			
1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
					1回			
1回								
						06:00, 12:00, 18:00		
							1回	
							00:00, 06:00, 12:00, 18:00	
								00:00, 06:00, 12:00