

診療科	血液内科
レジメン名称	HyperCVAD/HD-MTX・AC療法：ALL コース①
パスID	00000081
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考
 コース①：デキサメタゾン40mg/m² (po or div) でd1-4、d11-14に投与
 ※ゲムタジンをアドリアマイシン50mg/m²、テラルビシン30mg/m² (総使用量により変更) アドリアシン使用時、
 50mg/m² (d4) と16.6mg/m²精密持続点滴 (d4-6) で投与の場合あり

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ゲラネセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回									
2	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋 (2)	300 mg/m ² 1袋	330 mg/m ²	点滴静注	2時間で	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕									
3	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶 (100m)	1本		点滴静注	1時間で	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕									
4	ゲラネセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射 (ワンショット)					1回								
5	ドキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋 (2)	50 mg/m ² 1袋	55 mg/m ²	点滴静注	2時間で				1回								
6	ゲムタジン静注用20mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管 (20ml /	30 mg/m ² 10 mL	33 mg/m ²	点滴静注	2時間で				1回								
7	テラルビシン注射用10mg 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋 (2)	30 mg/m ² 1袋	33 mg/m ²	点滴静注	2時間で				1回								
8	ポンコピン注射用1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管 (20ml /	2 mg 10 mL	2 mg	静脈注射 (ワンショット)					1回								
9	ポンコピン注射用1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管 (20ml /	2 mg 10 mL	2 mg	静脈注射 (ワンショット)													1回