

診療科	血液内科
レジメン名称	HyperCVAD/HD-MTX・AC療法：ALL コース②
パスID	00000082
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考
コース②：メトトレキサートの終了12時間後からロイコブリン50mgを6時間ごとにIVする。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	ゲラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射（ワンショット）		朝, 夕			
2	注射用メトトレキサート5mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶（100mL）	100 mg/m2 1本	110 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回			
3	注射用メトトレキサート5mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500mL）	400 mg/m2 1本	440 mg/m2	点滴静注	11時間で	1回			
4	注射用メトトレキサート5mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500mL）	500 mg/m2 1本	550 mg/m2	点滴静注	12時間で	1回			
5	ゲラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用4大塚生食注TN/50mL1キット	1本 1 vial 1本		点滴静注	0時間で		朝, 夕	朝, 夕	
6	シタビオン点滴静注液400mg「NIG」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500mL）	3000 mg/m2 0 mL	3300 mg/m2	持続 点滴静注	3時間で		10:00, 20:00	10:00, 20:00	
7	ロイコブリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	16 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で		18:00		
8	ロイコブリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	8 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で			00:00, 06:00, 12:00, 18:00	
9	ロイコブリン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	8 A 40 mL		点滴静注	0.5時間で				00:00, 06:00, 12:00, 18:00