

診療科	血液内科
レジメン名称	Ph陰性B-ALL (成人例) 等寛解導入療法
パスID	00000086
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

★他に髄注 (MTX, AraC, PSL)、PSL (内服) 60mg/m²を併用
★60歳以上は、ダウマインを30mg/m²へ、エンドキンは500mg/m²へ、ロイテは3000U/m²へ減量。
★CD20高発現の場合、リツキサン併用
★G-CSFはday17より使用
補：病名に「リンパ芽急性リンパ腫」追加

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		
3	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンシヨット)		1回	1回	1回					1回		1回		1回		
4	注射用エンドキシン100mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋 (2)	750 mg/m ² 1 袋	825 mg/m ²	点滴静注	1.5時間で	1回													
5	ダウマイン静注用20mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m)	50 mg/m ² 1 本	55 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回	1回	1回											
6	オコピン注射用1mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管 (20ml/)	1.3 mg/m ² 0 mL	2 mg	静脈注射 (ワンシヨット)		1回							1回						
7	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m)	1 本		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回													
8	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管 (20ml/)	5 mL		静脈注射 (ワンシヨット)		終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時
9	ロイテ注射用5000 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋 (2) 大塚蒸留水/20mL1管	6000 組/m ² 1 袋 1 A	6600 組/m ²	点滴静注	2時間で								1回		1回		1回		

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1回					1回		1回		1回		1回		1回
1回							1回						
1回					1回		1回		1回		1回		1回
1回													
1回							1回						
1回													
終了時					終了時		終了時		終了時		終了時		終了時
					1回		1回		1回		1回		1回