

診療科	血液内科
レジメン名称	ネララビン療法
パスID	00000100
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

CTCAE grade 2以上に該当する神経系障害の兆候が認められた場合は投与中止。腫瘍崩壊症予防のためのアロプリノール（アロシトールなど）および注射時のpH調製のための炭酸水素ナトリウム注射液（メイロンなど）がない場合は医師に確認することとする。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	8時間で	1回		1回		1回
2	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	8時間で	1回		1回		1回
3	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	8時間で	1回		1回		1回
4	ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射（ワンショット）		1回		1回		1回
5	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管（20ml/	10 mL		静脈注射（ワンショット）		2回		2回		2回
6	アラジン [®] 静注用250mg	1500 mg/m ²	1650 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回		1回		1回