

診療科	血液内科
レジメン名称	R-トリアキシン療法 (DLBCL用)
パスID	00001102
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考

トリアキシンは国内臨床6クールまでとなっているため7クール目を行う時はDrに確認。リツキサンの前投薬ブルフェン・ポララミンあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	4時間で	1回	
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	4時間で	1回	
3	グラネセロン静注3mgシリンジ「サワイ」 デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 2 A 1 本		点滴静注	1時間で	1回	
4	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	1時間で	1回	
5	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 大塚生食注TN/50mL1キット	120 mg/m2 50 mL	132 mg/m2	点滴静注	10分で	1回	
6	リツキシマブ BS点滴静注100mg「ファイサー」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	375 mg/m2 0 mL	412.5 mg/m2	点滴静注	4時間で	1回	
7	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	3時間で		1回
8	グラネセロン静注3mgシリンジ「サワイ」 デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 2 A 1 本		点滴静注	1時間で		1回
9	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr		1回
10	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 大塚生食注TN/50mL1キット	120 mg/m2 50 mL	132 mg/m2	点滴静注	10分で		1回