

診療科	血液内科
レジメン名称	VR-CAP療法
パスID	00001140
1クール	21日間
最大クール数	8回まで

備考
原著：プレドニン 100mg/m² day1~5
前投薬としてブルフェン・ポララミン内服
リツキサンは適用通りに速度を指示

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋 水溶性プレドニン20mg	1袋 5A		持続 点滴静注	4時間で	1回											
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	4時間で	1回											
3	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	0.5時間で	1回											
4	リツキマフBS点滴静注100mg「ファイサー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/	375 mg/m ² 0 mL	412.5 mg/m ²	点滴静注	4時間で	1回											
5	グラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回											
6	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液ハック「フー」/250mL1袋(2	750 mg/m ² 1袋	825 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回											
7	ドキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/	50 mg/m ² 1A	55 mg/m ²	静脈注射 (ワンショット)		1回											
8	ヘルケイト注射用3mg 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/	1.3 mg/m ² 1.2 mL	1.5 mg/m ²	皮下注射 (SC)		1回			1回				1回				1回