

診療科	血液内科
レジメン名称	R-GCD療法
パスID	00001185
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

リツキサンはCD20陽性例のみ
d8の p l t 5~10万 or Neu500~1000のときGを25%減量
d8の p l t 5<5万 or Neu<500のときはG中止
新しいサイクルはNeu>1000&PL T >5万に回復後に
デカドロンは経口投与も可
リツキサン前投薬としてブルフェン・ポララミン内服

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ソルテム1輸液/200mL1袋 デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶)	1袋 5 vial		持続 点滴静注	1.5時間で	1回	1回	1回	1回					
2	ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)		1回								
3	ジエムサル注射用200mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1000 mg/m2 1本	1100 mg/m2	点滴静注	30分で	1回								
4	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2)	5 mg(AUC) 1袋	5.5 mg(AUC)	点滴静注	30分で	1回								
5	リツキマフBS点滴静注100mg「ファイサ-」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL)	375 mg/m2 0 mL	412.5 mg/m2	点滴静注	4時間で									1回
6	ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)										1回
7	ジエムサル注射用200mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1000 mg/m2 1本	1100 mg/m2	点滴静注	30分で									1回